

## 5.4 注目すべき種の分布状況

近年、ペットショップなどで購入した国外外来種が逃げ出したり、野外へ遺棄されるなどして、本来は日本に生息しない種が野外に生息し、農作物被害や生態系に深刻な影響を与えるケースがみられます。

ここでは、以上のような、国外外来種の中で主にペット由来と考えられる種の、河川水辺の国勢調査での確認状況について整理しました。

### 【飼育(ペット)由来の国外外来種】

(両生類・爬虫類・哺乳類調査)

#### • 増加傾向のミシシッピアカミミガメ

国外外来種の中でペット由来と考えられる種のうち、特定外来生物に指定されていない5種（キバラガメ、ミシシッピアカミミガメ、アナウサギ、チョウセンシマリス、ゴールデンハムスター）を対象として、確認状況を整理しました。

対象5種のうち、今回調査の13河川で確認されたのは、ミシシッピアカミミガメの1種でした。

(資料掲載:5-29~5-36ページ、5-39~5-40ページ)

### 1~4巡目調査の確認河川数の比較

種類	1巡目調査 (74河川)	2巡目調査 (118河川)	3巡目調査 (122河川)	4巡目調査 (43河川)
キバラガメ	0河川 [0.0]	0河川 [0.0]	1河川 [0.8]	0河川 [0.0]
ミシシッピアカミミガメ	25河川 [33.8]	53河川 [44.9]	71河川 [58.2]	30河川 [69.8]
アナウサギ	0河川 [0.0]	3河川 [2.5]	5河川 [4.1]	0河川 [0.0]
チョウセンシマリス	0河川 [0.0]	0河川 [0.0]	0河川 [0.0]	0河川 [0.0]
ゴールデンハムスター	0河川 [0.0]	1河川 [0.8]	0河川 [0.0]	0河川 [0.0]

※1~3巡目調査のデータは調査実施全河川のうち、種名等について真正化され、河川環境データベースに格納されている調査データを対象にした。

※()内は調査実施河川数を示す。

※[]内は確認河川数の調査実施河川数に対する割合(%)を示す。

ミシシッピアカミミガメは、北アメリカ産で、1950年代後半から、いわゆる「ミドリガメ」として販売・飼育され、1960年代後半から、野外で野生化した個体が見つかるようになりました。現在では本州、四国、九州のほかに、沖縄や小笠原父島からも生息が確認されています。河川や池沼、水田などに広く生息し、在来種のクサガメやイシガメと生息環境が競合すると考えられており、ミシシッピアカミミガメがこれら在来2種の生息に影響を与えることが憂慮されています。今回調査では、対象5種中唯一確認されました。また2巡目調査以降、確認河川数割合が増えており、増加傾向がうかがえます。

キバラガメは、ミシシッピアカミミガメと同じアカミミガメ属に属し、腹甲が黄色く、ペットショップなどで販売されています。本種も在来種のクサガメやイシガメと生息環境が競合すると考えられており、キバラガメがこれら在来2種の生息に影響を与えることが憂慮されています。今回調査河川では確認されていませんが、今回調査河川以外の河川において、3巡目調査の1河川で確認されています。


アナウサギは、原産地がイベリア半島とアフリカ北西部ですが、世界各地に移入され野生化されています。日本ではカイウサギとして知られ、簡易な施設で飼育できるので幼稚園や学校などでよく飼育されます。本種は、植食性で植物に対する影響が懸念されています。今回調査河川では確認されていませんが、今回調査河川以外の河川において、2巡目調査で3河川、3巡目調査で5河川において確認されています。

チョウセンシマリスは、ペットとして輸入された個体が各地で逃げ出し野生化して、日本産のエゾシマリスとの交雑や置き換わりが懸念されています。今回調査では確認されず、河川水辺の国勢調査ではこれまで確認されていません。


ゴールデンハムスターは、人によく馴れて飼いやすいため、ペットショップでもよく販売されています。今回調査河川では確認されていませんが、今回調査河川以外の河川において、2巡目調査の1河川で確認されています。

今回の調査では、国外外来種の中でペット由来と考えられる種の確認は、ミシシッピアカミミガメだけでしたが、今回の調査実施河川以外の河川では、キバラガメ、ゴールデンハムスター、アナウサギが確認されています。国外外来種は野外に放たれた場合、農作物被害や生態系に深刻な影響を与える等、様々な問題を及ぼす恐れがあり、ペットについても取り扱いに注意することが必要です。

1 巡目調査 (平成 3~7 年度)



2 巡目調査 (平成 8~12 年度)




凡例


- : 確認調査地区
- : 未確認調査地区

キバラガメの確認された地域（1 巡目調査、2 巡目調査）

3 巡目調査（平成 13～17 年度）



4 巡目調査（平成 18～21 年度）




凡例  
● : 確認調査地区  
○ : 未確認調査地区  
(河川名は平成 21 年度とりまとめ対象河川を示す)


注 1) 4 巡目調査は調査実施途中で、123 河川中 80 河川が調査未実施である。

キバラガメの確認された地域（3 巡目調査、4 巡目調査）

1 巡目調査（平成 3～7 年度）




2 巡目調査（平成 8～12 年度）




凡例  
● : 確認調査地区  
○ : 未確認調査地区

ミシシッピアカミミガメが確認された地域（1 巡目調査、2 巡目調査）

3 巡目調査（平成 13～17 年度）



4 巡目調査（平成 18～21 年度）



凡例

● : 確認調査地区


○ : 未確認調査地区

(河川名は平成 21 年度とり  
まとめ対象河川を示す)


注 1) 4 巡目調査は調査実施途中で、123 河川中 80 河川が調査未実施である。

ミシシッピアカミミガメが確認された地域（3 巡目調査、4 巡目調査）

1 巡目調査（平成 3～7 年度）




2 巡目調査（平成 8～12 年度）




凡例  
● : 確認調査地区  
○ : 未確認調査地区

アナウサギの確認された地域（1 巡目調査、2 巡目調査）

3 巡目調査（平成 13～17 年度）



4 巡目調査（平成 18～21 年度）




凡例

- : 確認調査地区
- : 未確認調査地区
- (河川名は平成 21 年度とりまとめ対象河川を示す)


注 1) 4 巡目調査は調査実施途中で、123 河川中 80 河川が調査未実施である。

アナウサギの確認された地域（3 巡目調査、4 巡目調査）

1 巡目調査（平成 3～7 年度）




2 巡目調査（平成 8～12 年度）




ゴールデンハムスターの確認された地域（1 巡目調査、2 巡目調査）

3 巡目調査（平成 13～17 年度）



4 巡目調査（平成 18～21 年度）



凡例  
 ● : 確認調査地区  
 ○ : 未確認調査地区  
 (河川名は平成 21 年度とりまとめ対象河川を示す)

注 1) 4 巡目調査は調査実施途中で、123 河川中 80 河川が調査未実施である。

ゴールデンハムスターの確認された地域（3 巡目調査、4 巡目調査）